



Semana de la Prevención del Cáncer de Próstata 2013: **Cerca de 2 mil hombres mueren al año en nuestro país por esta causa**

Con el slogan “Te Toca”, la Fundación de Pacientes CáncerVida realiza desde hoy jueves 24 y hasta el miércoles 30 de octubre, su primera Semana de la Prevención del Cáncer de Próstata, para concientizar a la población sobre el autocuidado, la prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad, la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres en Chile.

Médicos oncólogos, urólogos, autoridades de Salud, rostros y líderes de opinión se han sumado a esta cruzada en torno al cáncer de próstata, el tumor maligno más frecuente en Chile, y el segundo tumor que más hombres mata. “Al año, en nuestro país, mueren cerca de 2 mil hombres por esta causa”, según el **Dr. Tomás Olmedo, profesor asistente de Urología en la Universidad de Chile y especialista de Clínica Las Lilas.**

Según los expertos, el cáncer de próstata comienza a aparecer entre los 45-50 años, y aumenta su frecuencia con la edad. “Mientras nuestra población masculina envejece mayores son los riesgos de contraer cáncer prostático”, señala el **Dr. Diego Reyes, urólogo del Instituto Nacional del Cáncer.**

No existen conductas o recomendaciones para evitar su aparición, por esta razón es tan importante el examen preventivo.

Este tumor maligno no produce síntomas; es silencioso hasta etapas avanzadas de la enfermedad, cuando ya no existe oportunidad de cura. “Cuando el cáncer de próstata es detectado en etapas tempranas, prácticamente todos los pacientes pueden ser curados con los tratamientos actuales”, sostiene el **Dr. Francisco Javier Orlandi, oncólogo asesor de Fundación CáncerVida y especialista de Clínica Indisa.**

Cómo prevenir

- La detección precoz se inicia con el antígeno prostático específico y el tacto rectal
- Si alguno de éstos se encuentra alterado, debe realizarse una biopsia de la próstata para confirmar o descartar la presencia de un cáncer.
- La detección precoz debe incluir ambos exámenes, antígeno prostático específico y tacto rectal. Ningún examen es mejor que el otro, ambos son complementarios y necesarios.
- Si Ud. tiene 40 años o más, le recomendamos consultar a su médico para iniciar este estudio. Recuerde que, aunque Ud. no sienta molestias, debería realizarse este control.